

## Oiseaux visibles dans nos jardins en hiver

Accenteur mouchet : taille d'un petit moineau ; plumage gris et roux, strié. Bec fin, insectivore et granivore, observé par au moins 5 personnes. Exclusivement en hivernage ; niche en altitude (Cévennes)

Bergeronnette grise : insectivore et granivore, jardins, zones urbanisées et le long des cours d'eau, un groupe de 25 a été observé dans un jardin. Sédentaire. Aussi appelée « hochequeue ».

Bouvreuil pivoine : hivernant rare, observé en ripisylve. Niche en altitude dans les Cévennes et ailleurs.

Chardonneret élégant : granivore (et insectivore lors du nourrissage des petits, comme chez tous les fringillidés), très bruyant, avec un joli chant cristallin. Sédentaire.

Choucas des tours : corvidé, niche dans les tours, les vieux bâtiments et les trous de platanes, joueurs et intelligents. Sédentaire.

Chouette hulotte : est connue de certains habitants ; peut habiter les jardins bien boisés. Sinon, niche en ripisylve. Hululements bien connus. Sédentaire.

Etourneau sansonnet : très tachetés en hiver, nombreux en automne dans les vignes, chantent avec beaucoup d'imitations de chants ou cris d'autres oiseaux ou de bruits mécaniques

Fauvette à tête noire : insectivore, frugivore (olives, lierre), population nicheuse locale renforcée par un arrivage d'oiseaux du nord en hiver. Femelle et jeunes ont une tête brune.

Fauvette mélanocéphale : jardins et zones avec buissons ou petits arbres, œil rouge ; calotte noire caractéristique pour le mâle ; la femelle est plus terne (tête grise). Insectivore et frugivore, assez visible en hiver dans les buissons, cris caractéristiques durs et roulés.

Fauvette pitchou : insectivore et frugivore (olives et petites baies), garrigue et jardins en hiver. Ces deux fauvettes sont sédentaires.

Grive mauvis : espèce plutôt rare, observée certaines années en hiver uniquement (frugivore). Flancs roux caractéristiques.

Grive musicienne : consomme beaucoup de vers et limaces ou escargots, également des fruits. Pourrait nicher en ripisylve, chant à motifs répétés à l'aube. Surtout en hivernage, mais espèce discrète.

Grive draine : la plus grosse des grives, fréquente surtout les grandes prairies. Cris roulés caractéristiques. Sédentaire.

Grosbec casse-noyau : espèce occasionnelle et rare en hiver (niche en altitude). Grand amateur de graines et noyaux. A presque 2 fois la taille d'un pinson, avec un bec énorme.

Merle noir : mâle noir avec bec jaune et femelle brune avec bec brun, se nourrit à terre, invertébrés (vers, larves), figues en août été, aussi des fruits en hiver (lierre etc.). Sédentaire, avec 2 ou 3 nichées/an, peu nombreux, niche en milieu fermé boisé, moins farouche là où il n'est plus chassé. surtout en milieux ouverts pour la nourriture et nicheurs en milieux fermés

Mésange bleue : répandue, insectivore et granivore, récupère pour nicher et dormir les trous creusés faits par les pics (diam 2-2,5 cm), jusqu'à 10 à 12 œufs/niché (normalement une seule), assez agressive en hiver. Sédentaire, comme l'espèce suivante.

Mésange charbonnière : 5 fois plus nombreuse que la bleue, niche dans les trous de pics (diam au moins 3cm), une seule nichée de moins de 10 œufs, forte mortalité des jeunes de l'année, comme chez toutes les mésanges. Ces deux mésanges peuvent aussi nicher dans les trous de murs de vieilles maisons.

Mésange huppée : espèce préférant les conifères, ici dans les pins (Draille), niche tôt, assez bruyante mais ne vient pas au nourrissage. Sédentaire.

Mésange à longue queue : appartient à une autre famille que les mésanges typiques. Vit en couple au printemps, mais en groupe en hiver, couvrant de très grands territoires.

Mésange noire : très petite mésange (plus petite que la bleue), arrive du grand nord certaines années, pour hiverner en milieu boisé (ripisylve). Pourrait fréquenter les jardins lors de gros passages. Niche en altitude.

Moineau domestique : sa population a chuté à cause d'un parasite mais revient remonte la pente depuis quelques années.

Monticole bleu : espèce de rochers et falaises (Puech), peut descendre dans les jardins à la recherche se nourrit d'olives. Sédentaire.

Pie bavarde : corvidé, insectivore, frugivore et carnivore, opportuniste et pilleur occasionnel (œufs, oisillons), nids assez grands avec un toit ; jacasse. Parfaitement sédentaire.

Pigeon ramier : très gros pigeon sédentaire qui niche en milieu boisé (dont les ripisylves). On observe aussi des vols migratoires en automne, qui vont hiverner en Espagne.

Pinson des arbres : mâle plus coloré que la femelle. Niche en ripisylves et jardins boisés, nombreux en hiver (avec arrivage d'oiseaux du nord), alors granivores ; vol haché. Espèce très commune au nourrissage, comme les mésanges, mais toujours à terre (donc aussi une proie facile des chats). Migrateurs diurnes (comme les verdiers, pinsons, alouettes, bergeronnettes).

Pouillot véloce : hivernant occasionnel. Surtout insectivore, mais peut prendre de petits fruits.

Roitelet triple-bandeau: comme la Mésange huppée, niche dans les pins et présent dans la Draille. Sédentaire mais discret.

Rougegorge familier : sédentaire, avec une augmentation de population en hiver (oiseaux venant du nord). et hivernants, Mange surtout au sol (insectes, petites graines), et prend aussi beaucoup de petits fruits. Proie facile des chats domestiques. Défend un territoire tout l'hiver, et les femelles chantent aussi à cette saison, ce qui est exceptionnel chez les passereaux.

Rougequeue noir : cavernicoles, sur les toits et à terre, insectivores, quelques fruits (par ex. olives), jusqu'à 3 nichées/an. Typiquement, fait trembler sa queue rousse, comme d'ailleurs le Rougequeue à front blanc, qui lui est migrateur et revient au printemps.

Serin cini : petit fringillidé jaune strié, apparenté au canari domestique (des Iles Canaries). Plus commun en été, y compris dans les jardins, mais ils peuvent hiverner par temps doux (sinon l'espèce hiverne sur la côte).

Tarin des aulnes : petit fringillidé vert et jaune, strié, assez local mais hiverne dans les ripisylves où il mange (en groupes) les fruits secs des aulnes. Pourrait visiter le nourrissage lors d'hivers froids.

Tourterelle turque : en Europe depuis les années 50/60, est arrivée du Proche Orient. Maintenant parfaitement sédentaire. N'est pas en compétition avec la Tourterelle des bois, qui est plus campagnarde. Toujours en couple.

Verdier d'Europe : milieux arborés ou agricoles, assez commun et sédentaire.

Remarque : les fringillidés (espèces granivores), étourneaux, bergeronnettes, pigeons ramiers migrent de jour, souvent en groupes, tandis que les espèces insectivores (fauvettes, pouillots, rougegorges, grives etc.) migrent de nuit et de façon isolée.